

## がん化学療法処方

プロトコール名: 胃癌CDDP/TS-1療法(開始第8日目) (1クール35日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d7	① ラクテック 500mL	div	120分
	② ラクテック 500mL	div	120分
	③ ラクテック 500mL	div	120分
d8	① ソルデム3A 1000mL+10%NaCl 20mL+硫酸Mg1mEq/mL 8mL	div	120分
	② グラニセトロンバッグ 1mg/50mL+デキサート注射液 9.9mg	div	15分
	③ 20%マンニトール 100 mL	div	30分
	④ シスプラチン注 60mg/m <sup>2</sup> +生食 300mL	div	120分
	⑤ ソルデム3A 1000mL+10%NaCl 20mL+硫酸Mg1mEq/mL 8mL	div	120分
d8	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間～1時間半前に内服	po	
d1-21	エスワン 80 mg/m <sup>2</sup> (1日2回朝夕食後)をd1-21投与、2週間休薬 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.25m <sup>2</sup> 未満:80mg/日 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満:100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上:120mg/日  5週を1クールとする		

プロトコール適応時表示コメント

d8のシスプラチンは、入院にて実施する。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄: