

がん化学療法処方

プロトコール名 胃癌 Nivolumab + SOX療法 (1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液50mL(プライミング用)	div	-
	② 生理食塩液100mL + オプジーボ360mg 投与時は0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用。 体重30kg未満の場合、総液量100mL以下とする。	div	30分
	③ 生理食塩液50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液6.6mg+5%ブドウ糖液50mL	div	15分
	⑤ エルプラット点滴静注液 130mg/m ² +5%ブドウ糖液500mLL	div	120分
	⑥ 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1-14	エスワン 80 mg/m ² (1日2回朝夕食後) 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.25m ² 未満:80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満:100mg/日 1.5m ² 以上:120mg/日	po	-

プロトコール適応時表示コメント

d1-14 S-1 1日2回内服(体表面積1.25m²未満:80mg/日、1.25m²以上1.5m²未満:100mg/日、1.5m²以上:120mg/日)

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)