

## がん化学療法処方

プロトコール名 胃癌 Nivolumab + CapeOX療法 (1クール21日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液50mL(プライミング用)	div	-
	② 生理食塩液100mL + オブジーボ360mg 投与時は0.2又は0.22 $\mu$ mのインラインフィルターを使用。 体重30kg未満の場合、総液量100mL以下とする。	div	30分
	③ 生理食塩液50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液6.6mg+5%ブドウ糖液50mL	div	15分
	⑤ エルプラット点滴静注液 130mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液500mL	div	120分
	⑥ 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1-14	カペシタビン 2000mg/m <sup>2</sup> /日 (1日2回朝夕食後) 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.36m <sup>2</sup> 未満:2400mg/日 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満:3000mg/日 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満:3600mg/日 1.96m <sup>2</sup> 以上:4200mg/日	po	-

プロトコール適応時表示コメント

d1-14 カペシタビン1日2回内服(体表面積1.36m<sup>2</sup>未満:2400mg/日、1.36m<sup>2</sup>以上1.66m<sup>2</sup>未満:3000mg/日、1.66m<sup>2</sup>以上1.96m<sup>2</sup>未満:3600mg/日、1.96m<sup>2</sup>以上:4200mg/日)

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)