

がん化学療法処方

プロトコール名: 胃癌Trastuzumab+XP療法 (1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d0	① ラクテック500ml	div	120分
	② ラクテック500ml	div	120分
	③ ラクテック500ml	div	120分
d1	① 生理食塩液50mL(プライミング用)	div	-
	② トラスツズマブ8mg/kg(2コース目以降は6mg/kg)+生理食塩液250mL トラスツズマブ150mgを注射用水7.2mlに溶解し適量加える。	div	90分 (2回目以降は30分可)
	③ 生理食塩液50mL	div	5分
	④ ソルデム3A 1000mL+10%NaCl 20mL+硫酸Mg1mEq/mL 8mL	div	120分
	⑤ グラニセトロンバッグ 1mg/50mL+デキサート注射液 9.9mg	div	15分
	⑥ マンニトールS 100ml	div	30分
	⑦ シスプラチン注 80mg/m ² +生理食塩液 300mL	div	120分
	⑧ ソルデム3A 1000mL+10%NaCl 20mL+硫酸Mg1mEq/mL 8mL	div	120分
d1	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服		
d1-14	カペシタビン 2000mg/m ² /日 (1日2回朝夕食後) 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.36m ² 未満:2400mg/日 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/日 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/日 1.96m ² 以上:4200mg/日		

プロトコール適応時表示コメント

d1-14 カペシタビン1日2回内服(体表面積1.36m²未満:2400mg/日、1.36m²以上1.66m²未満:3000mg/日、1.66m²以上1.96m²未満:3600mg/日、1.96m²以上:4200mg/日)

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄: