

がん化学療法処方

プロトコール名: 乳癌 トラスツズマブ+ビンレルビン療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1,d8	① グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	div	15分
	② ロゼウス静注液25mg/m ² +生理食塩液50mL ビンレルビン25mg/m ²	div	5分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ トラスツズマブBS点滴静注2mg/kg+生理食塩液250mL トラスツズマブは、2mg/kg アレルギー症状などの副作用がなければ、 2回目以降は、投与時間を30分に短縮可能。	div	90分
	⑤ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d15	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② トラスツズマブBS点滴静注2mg/kg+生理食塩液250mL トラスツズマブは、2mg/kg アレルギー症状などの副作用がなければ、 2回目以降は、投与時間を30分に短縮可能。	div	90分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分

プロトコール適応時表示コメント

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)